

| | |
|---|---|
| Genre- espèce | Cupressocyparis X leylandii /Cupressus x Leylandi |
| | Cyprés de leylande |
| Famille | Cupressaceae |
| Type de végétal | |
| Photos (générale et zoom) | |
| Photo 1 Vue d'ensemble du végétal | Photo2 Zoom d'une partie du végétal étudié |
|  |  |
| Hauteur – port et diamètre | <ul style="list-style-type: none"> Port Fastigié Taille : Jusqu'à 30 m |
| Morphologie de la partie végétative (tige - feuilles – racines) | <ul style="list-style-type: none"> Tronc : Rouge, brune, se détachent en longue plaque Description de la feuille : Persistante, écaille aplatie vert foncé, alterné Racine traçantes et superficiel |
| Morphologie de la partie reproductrice (fleurs – fruits – graines) | <ul style="list-style-type: none"> Description de la fleur : Fleur mâle et femelle Description des fruits : Fruit globuleux Description des graines : Infertile |

| Exigences et besoins | | | |
|---|---------|--|-----------|
| Type de sol | Climat | Exposition | Rusticité |
| Profond, riche, bien drainé | Tempéré | Tout type d'exposition | -20 |
| Maladies | | Ravageurs | |
| Chancre cortical (champignon) Dessèchement et écoulement de sève sur le rameau (Favorisé par l'humidité et par les plaies) LUTTE : Désinfection des outils | | Puceron (Dessèchement des rameaux) Favorise la fumagine par leurs miellats LUTTE: lâcher de coccinelle /chrysope/micro guêpe (micro hyménoptère parasite) Savon noir Pyréthre | |
| Intérêt ornemental et utilisation | | Haie, arbre isolé Croisement entre naturelle entre Chamaecyparis nootkatensis et Cupressus macrocarpa, même si c'est toujours en débat Sève contiens une substance allergène | |
| Intérêt pour la biodiversité | | - Arbre mellifère | |
| Bibliographie / Webographie | | | |